



# FOURMI'CLAC

## Poudre insecticide

**Poudre insecticide en poudrage ou arrosage contre les fourmis**

### USAGE :

Poudre mouillable, longue durée d'efficacité (jusqu'à 3 mois).

**Contre les fourmis :** saupoudrer ou pulvériser directement sur les insectes, les lieux de passage ou les lieux à protéger. Les insectes traités contamineront leurs congénères contribuant à détruire toute la colonie.

**Contre les puces, blattes, scorpions et scolopendres :** saupoudrer ou pulvériser les lieux de passage ou les endroits pouvant être fréquentés par ces insectes (dessous de meubles, machines, évier, tapis, moquette, bas de paroi...).


### MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

La poudre Fourmi'CLAC est utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (aux abords de tous habitats et locaux).

En saupoudrage : • environ 10 g/m<sup>2</sup> contre les fourmis, • environ 20 g/m<sup>2</sup> contre les blattes, puces, scolopendres et scorpions. Diluée dans l'eau : • à raison de 100 g de poudre pour 1 litre d'eau (1 litre pour 10 m<sup>2</sup>).

### COMPOSITION :

**Cyperméthrine 10 g/kg (CAS 52315-07-8) sur support minéral.**



### CONSEIL DE PRUDENCE

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte agréé.

### CONDITIONNEMENT :

IN-CYP-60014 : flacon poudreur 250g  
12/carton

IN-CYP-60029 : flacon poudreur 900g  
6/carton